

MAXIMA
ABSORCIÓN



CLINICAL

BLOOD BUILDER

60 cápsulas

ALTO CONTENIDO DE HIERRO
(BISGLICINATO),
COBRE, ÁCIDO FÓLICO,
VITAMINA B12 Y VITAMINA C

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

EL HIERRO CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN
NORMAL DE GLÓBULOS ROJOS
Y DE HEMOGLOBINA

CLINICAL



BLOOD BUILDER

Suplemento Alimentar • Cantidad Líquida: 45 g • 60 cápsulas
Complemento Alimenticio • Cantidad Neta: 45 g • 60 cápsulas

Alto teor de Hierro, Zinco, Cobre, Selénio, Vitamina A, C, B6, B12 e Ácido Fólico • O Cobre contribui para o transporte normal do ferro no organismo • A Vitamina B12 e a Vitamina B6 contribuem para a formação normal de glóbulos vermelhos • O Ferro contribui para a formação normal de glóbulos vermelhos e de hemoglobina, e para o transporte normal do oxigênio no organismo • O Ácido Fólico contribui para a formação normal do sangue • A Vitamina A contribui para o normal metabolismo do ferro • A Vitamina C aumenta a absorção de ferro.

Blood Builder GoldNutrition® Clinical é uma fórmula única no mercado que combina vitaminas e minerais, fornecendo por toma diária um alto teor de Ferro, proveniente do ferro bisglicinato – ferro quelato, de superior absorção e que não provoca irritação intestinal –, de Zinco, de Selénio, de Cobre, de Ácido Fólico e das Vitaminas B12, B6, A e C.

Alto contenido de Hierro, Zinc, Cobre, Selenio, Vitamina A, C, B6, B12 y Ácido Fólico • El Cobre contribuye al transporte normal de hierro en el organismo • La Vitamina B12 y la Vitamina B6 contribuyen a la formación normal de glóbulos rojos • El Hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina, y al transporte normal de oxígeno en el cuerpo • El Ácido Fólico contribuye a la formación normal de células sanguíneas • La Vitamina A contribuye al metabolismo normal del hierro • La Vitamina C mejora la absorción del hierro.

Blood Builder GoldNutrition® Clinical es una fórmula única en el mercado que combina vitaminas y minerales, aportando por toma diaria un alto contenido de Hierro, proveniente del bisglicinato de hierro – hierro quelado de absorción superior que no causa irritación intestinal –, de Zinc, de Selenio, de Cobre, de Ácido Fólico, de Vitamina B12, B6, A y C.

Consumir de preferência antes do fim de/L: ver embalagem
Consumir preferiblemente antes de/L: ver envase

MAXIMA
ABSORÇÃO



CLINICAL

BLOOD BUILDER

60 cápsulas

ALTO CONTEÚDO DE FERRO
(BISGLICINATO),
COBRE, ÁCIDO FÓLICO,
VITAMINA B12 E VITAMINA C

SUPLEMENTO ALIMENTAR

O FERRO CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO
NORMAL DE GLÓBULOS VERMELHOS
E DE HEMOGLOBINA

Informação Nutricional / Información Nutricional	Por 100 g	Por cápsula
Vitamina A	0,091 g	500 µg (63%DDR*)
Vitamina C	14,54 g	80 mg (100%DDR*)
Vitamina B6	0,91 g	5 mg (357%DDR*)
Ácido Fólico	0,036 g	200 µg (100%DDR*)
Vitamina B12	0,0036 g	20 µg (800%DDR*)
Ferro / Hierro	7,09 g	39 mg (279%DDR*)
Zinco / Zinc	2,73 g	15 mg (150%DDR*)
Cobre	0,18 g	1 mg (100%DDR*)
Selénio	0,0091 g	50 µg (91%DDR*)

*DDR – Dose Diária Recomendada / Cantidad Diaria Recomendada.

Ingredientes: Bisglicinato de Ferro/ Hierro, Cápsula (gelatina), Gluconato de Zinco/ Zinc, Ácido L-Ascórbico, Incrementador de volume/ volumen (Maltodextrina, Celulose/ Celulosa microcristalina), Levedura de selénio/ Levadura de selenio, Gluconato de cobre, Piridoxina-5-fosfato, Acetato de retinilo, Antiaglomerante (Dióxido de silício/ silício, Estearato de Magnésio/ Magnesio), Ácido pteroilmonoglutâmico/ pteroilmonoglutámico, Cianocobalamina.

Toma Diária: Tomar 1 cápsula, uma vez por dia, de preferência antes da refeição. Não exceder a dose diária recomendada./ **Modo de empleo:** Tomar 1 capsula una vez al día, preferiblemente antes de la comida. No exceder la cantidad diaria recomendada.

Aviso: Não tomar em caso de hemocromatose e hemossiderose, ou hipersensibilidade a algum dos constituintes da fórmula. Deve consultar o seu médico antes de iniciar uma suplementação com ferro no caso de gravidez, aleitamento, anemia severa, antecedentes de doenças renais, intestinais, úlcera péptica, ou hepatite. Em caso de toma de antibióticos afaste a toma do suplemento num intervalo de três horas./ **Aviso:** No tomar en caso de hemocromatosis o hemossiderosis, o hipersensibilidad a algunos de los componentes de la formula. En caso de embarazo, lactancia, anemia severa, antecedentes de enfermedad renal, intestinal, ulcera péptica, o hepatitis, consulte con su médico antes de iniciar un complemento con hierro. En caso de toma de antibióticos separar la toma con un intervalo de tres horas.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter num local fresco e seco, ao abrigo da luz, fora do alcance das crianças./ Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener en lugar fresco y seco, abrigado de la luz, fuera del alcance de los niños.